



| Kalvsjukdom | Typiska symtom | Vad händer? | Åtgärder |
|-----------------------------|--|---|---|
| Diarré, ej infektiös | Pastaliknande, gelatinös, vit eller gul träck. Dålig/upphörd aptit, viktförlust, nedsatt allmäntillstånd. Uttorkad. | Störningar i mag- och tarmkanalen påverkar vätskebalansen i kroppen. Vanliga orsaker är felaktig utfodring och stress. | Undvik snabba foderbyten. Ha bestämda rutiner för utfodring. Kontrollera mjölkutfodringen: temperatur, hygien. Håll kalven varm, ersätt närings- och vätskeförlusterna med mjölk och vätskeersättning. Se över valet och blandningen av mjölknäring. |
| Diarré, infektiös | Riklig, vattentunn, gul eller vit diarré, ibland blodblandad eller grön. Illaluktande. Snabb viktnegång, dåligt allmäntillstånd, svag kalv med eller utan feber. | Orsakas av bakterier, virus eller parasiter. Smitta via träck. | Testa råmjölkskvaliteten. Se till att varje kalv får 3-4 liter bra råmjölk inom 1-2 timmar. Noggrann hygien med mjölkutfodring. Håll kalven varm, ge vätskeersättning. Kontrollera om kalven har andra sjukdomar t ex svullen led eller navel. Kontakta veterinär för provtagning och behandling. Vaccin finns mot vissa. |
| Trumsjuka | Normala våmkontraktioner upphör och rapningar sker ej, stora mängder gas samlas i våmmen. | Struprännan fungerar ej och leder mjölk till våmmen i stället för löpmagen. Alternativt löpmagsöverfyllnad eller feljäsning av våmnehållet. | Kräver oftast veterinärbehandling. Sondning med mjuk slang för att få bort gasen. Utfodring med grovfoder. Ge kalven mjölk via napp. Prova att själv lösa tidiga/lindriga fall med hjälp av olja/mjölk/diskmedel alt. minifom-droppar. |
| Lunginflammation | Nedsatt/upphörd aptit, snabb, oregelbunden eller ansträngd andning, feber, näs-, ögonflöde (ofta tjock, varig), torr hosta | Infektion av lungor. Oftast virus men ibland även bakterier. Kan ge tillfälliga eller permanenta skador i lungvävnaden. Smittas främst via sekret från nos, ögon eller mun. | Minimera stress och nos-noskontakt. Testa råmjölkskvaliteten. Se till att varje kalv får 3-4 liter bra råmjölk inom 1-2 timmar. Kontrollera stallmiljö: luftfuktighet, ventilation, förändringar i temperaturen, tillräckligt med strö. Omedelbar veterinärbehandling. Tidig diagnos och behandling är viktig. Provtva för smittämne. Ev vaccinerings. Förebygg diarré. |
| Navelinfektion | Svullen, öm, varm navel med sekret. Feber. Hängig kalv. | Bakterierna från miljön kommer in via naveln och sprider sig i kroppen, t.ex. till leder. | Ren kalvningsmiljö och kalvbox. Se till att varje kalv får 3-4 liter bra råmjölk inom 1-2 timmar. Konsultera veterinär angående behandling. |
| Blodförgiftning | Svag nyfödd kalv, ovillig att stå, har dålig sugreflex. Ibland i kombination med svullna leder, diarré, lunginflammation, grumliga ögon, eller svullen navel. | Förekommer då sjukdomsframkallande mikroorganismerna eller giftiga ämnen som de producerar har spridit sig i kalvens kropp. Infektionsämnena kommer ofta in i kalvens kropp via den sjuka kon och smittade efterbörden, navelsträngen, munnen eller nosen eller via sår på huden. | Se till att hålla sinkon/ den nykalvade kon frisk och väl näringsförsörd. Förbättra kalvningshygien. Testa råmjölkskvaliteten. Se till att varje kalv får 3-4 liter bra råmjölk inom 1-2 timmar. Noggrann hygien med mjölkutfodring. |
| Lusangrepp | Hårlöshet, klåda. Vanlig på halsen, nacke, bog och eller svans. Randig hals. Dålig tillväxt. | Lusägg och löss synliga i pälsen. Smittar mellan djur eller redskap. | Avlusning med receptbelagda preparat, kontakta veterinär. Förebyggs med rena och klippta djur. |
| Ringorm | Runda, hårlösa fläckar med gråa krustor. Börjar ofta från nacke och huvud men kan finnas över hela kroppen. | Svampinfektion. Svamparna växer i hårrötterna. Sprids via direkt och indirekt kontakt. Sporer överlever i årtal. | Konsultera din veterinär. Behandling finns utvärtes och det finns vaccin. Stalltvätt, desinfektion, mi solljus, optimal utfodring förebygger. Minimera hudskador/skav. |

De sammanfattande viktigaste tipsen!

- Kolla alla kalvar varje morgon och kväll
- Anteckna/journalför avvikelser
- Lär dig att titta efter sjukdomstecken på kalvarna
- Ge varje sjuk kalv bra understödande behandling (lagom varmt, dragfritt, torrt, rent och extra vätska och eller mjölk)
- Isolera sjuka alternativt friska kalvar
- Veterinärkontakt

